



DISERBO CARCIOFO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Pendimetalin	30,4 38,72	1,5 - 3 2 ,50	(1) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-emergenza Pre-ricaccio	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen (1) Linuron	42,9 37,6	0,5 - 0,75 0,8 - 1,5	(1) Sono ammesse solo applicazioni localizzate lungo la fila della coltura nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio
Post-emergenza Post-ricaccio	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon(1) (2) Oxifluorfen (1) (2) (4) Metazaclor (5) Pyridate (3) Propizamide (5)	34,1 42,9 43,1 45,0 80	1 - 2 0,75 - 1 1,5 - 2 1,3 - 2 1,75 - 2	(1) Contro l'oxalis nelle prime fasi fenologiche possono essere utilizzate dosi più elevate (2) Proteggere le foglie con opportuna schermatura; (3) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno (4) Sono ammesse solo applicazioni localizzate lungo la fila della coltura nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio (5) Un solo intervento all'anno tra Metazaclor e Propizamide
Post-emergenza Post-ricaccio	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	10,9 9,7 4,93 5	1,5 - 2,5 1 1 - 1,5 1 - 1,5	