



DISERBO MAIS

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,7	1,5 - 3	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina (1) Pendimetalin Isoxaflutole (2) Aclonifen Flufenacet Dimetenamide-P S-Metolaclor (Mesotrione-Terbutilazina-S-metolaclor) (1) (S-metolaclor + Terbutilazina) (1) (Mesotrione + S-metolaclor) Petroxamide Clomazone (3) (Isoxaflutole+Thiencarbazone+Cyprosulfamide) (4) (Isoxaflutole + Cyprosulfamide)	50 31,70 4,27 49 60 63,9 86,49 (3,39+16,94+28,23) (28,9 + 17,4) (5,58 + 46,5) 55,6 30,74 (3,97 + 1,59 + 2,62) (4,4 + 4,4)	1,5 1,5 - 3 1,2 - 1,5 1,5 - 2 0,80 1 - 1,3 1,5 4,5 4 - 4,5 2 2 0,25 2 1,7 - 2	(1) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (1) Terbutilazina impiegabile solo con formulati nei quali è inserita con altre s.a. (2) Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon (3) Non utilizzare su terreni sabbiosi e ciottolosi (4) Al massimo 1 intervento all'anno
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	Un trattamento: 0,040 - 0,060 Due trattamenti: 0,030 + 0,030	
		Nicosulfuron	4	Un trattamento: 0,8 - 1,2 Due trattamenti: 0,5 + 1	
		Tifensulfuron - metile (Florasulam + Fluroxipir) Prosulfuron Isoxaflutole (1) Sulcotrione Mesotrione Clopiralid (Foramsulfuron + Isoxadifen ethil) Dicamba Fluroxipir (Mesotrione + Terbutilazina) (2) (Isoxaflutole+Thiencarbazone+Cyprosulfamide) (3) (Petroxamide + Terbutilazina) (2)	50 (0,10 + 14,57) 75 4,27 26 9,1 75 (2,33 + 2,33) 21,2 20,6 (6,2 + 29,4) (3,97 + 1,59 + 2,62) (27,8 + 2 3,2)	0,015 1,00 0,025 1,20 1,00 0,5 - 1 0,15 2 - 2,7 0,75 - 1 0,5 - 0,7 1 - 1,5 2 3	(1) Con Isoxaflutole intervenire in post emergenza precoce (2) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (3) Al massimo 1 intervento all'anno



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

AGGIORNAMENTO 2014

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	(Isoxaflutole + Cyprosulfamide) (Dimetenamid-P + Pendimetalin) (Tembotrione + Isoxadifen – ethyl)	(4,23 + 4,23) (19,7 + 23,2) (4,31+ 2,15)	1,7 - 2 3 2	
	Dicotiledoni	Tritosulfuron (1) (Tritosulfuron + Dicamba) (1) (Metil oleato + Metil palmitato) (2) Bentazone	71,4 (25 + 50) 37,5 87	0,05 - 0,07 1 1 1,1 - 1,5	(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
	Equiseto	MCPA	22,2	0,5	Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais