



## DISERBO FRUMENTO DURO E ORZO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S. a.</i>	<i>L. o Kg/ha</i>	<i>Note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,70	1,5 - 3	<b>(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Dicotiledoni	Bifenox	40,8	2	
<b>Pre semina Pre emergenza</b>	Graminacee	Tri – allate (1)		3,6	<b>(1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale</b>
<b>Post emergenza precoce</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican	42,0	0,3	
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1)	35	0,2	<b>(1) Solo in miscela con altri diserbanti di post emergenza, in terreni particolarmente infestati da papavero e cardo</b>
		(Clodinafop-propargil+ Cloquintocet-Mexyl + Diflufenican) (1)	(5,5 + 1 + 3,77)	0,75	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr Diethyl) (1)	(16,8 + 1,00 + 8,00)	0,33	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
	Graminacee	(Fenoxaprop-p-etile+Mefenpir-dietile) (1)	(5,24 + 2,86)	0,7 - 1,5	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		Tralkoxidim (Pinoxaden + Cloquintocet-Mexyl)	34,67 (5,05 + 1,26)	1,0 0,8 - 1	
		(Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(22,3 + 5,60)	0,25	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>
		(Clodinafop-propargil + Cloquintocet-Mexyl + Pinoxaden) (1)	(2,53 + 0,63 + 2,53)	1,0	<b>(1) Non ammesso su orzo</b>



Epoca d'impiego	Infestanti controllate	Sostanza attiva	% di S. a.	L. o Kg/ha	Note
Post emergenza	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile	75,0	0,050 - 0,080	(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
		Metsulfuron metile	20,0	0,015 - 0,020	
		Tribenuron-metile	50,0	0,020 - 0,030	
		Triasulfuron	20,0	0,037	
		Tritosulfuron (1)	71,4	0,05 - 0,07	
		(Tritosulfuron + Dicamba) (1)	(25,0 + 50,0)	0,12 - 0,20	
		Metil oleato + Metil palmitato (2)	37,5	0,50	
		Clopiralid	9,5	0,8	
		Dicamba	21,2	0,4 - 0,5	
	Dicotiledoni con Galium e Graminacee	(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-etile+ Mefenpir-dietile) (1)	(0,79+6,32 + 2,37)	1,25	(1) Non ammesso su orzo
		(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron + Mefenpir-dietile) (1)	(0,60 + 3 + 9)	0,50	(1) Non ammesso su orzo
		(Pyroxulam + Florasulam + Cloquitocet mexyl) (1)	(7,08 + 1,42 + 7,08)	0,265	(1) Non ammesso su orzo
		(Pinoxaden + Clodinafop-propargil + Florasulam + Cloquintocet-Mexyl) (1)	(3,03 + 3,03 + 0,76 + 0,76)	0,67 - 1	(1) Non ammesso su orzo
		(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron- methyl-sodium + Amidosulfuron + Mefenpyr Diethyl) (1)	(14 + 0,83 + 6,00 + 6,70)	0,3 - 0,4	(1) Non ammesso su orzo
	Dicotiledoni Con Galium	Florasulam (Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr) Amidosulfuron Fluroxipyr Dicamba	4,84 (1,8 + 18,2 + 3,6) 75 20,6 21,2	0,1 - 0,125 4 0,02 - 0,04 0,7 - 0,9 0,4 - 0,5	(1) Su alcune cvs possono provocare leggere fitotossicità

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti