



## DISERBO FAVA

| <i>Epoca d'impiego</i> | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i>                                      | <i>% di S.a.</i>           | <i>l o kg /ha</i> | <i>Limitazioni d'uso e note</i>   |
|------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---|
| <b>Pre semina</b>      | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate   | 30,4                       | 1 - 2             | Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto<br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| <b>Pre emergenza</b>   | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Imazamox<br>Pendimetalin (1)<br>Imazamox + Pendimetalin (1) | 3,7<br>38,72<br>1,6 + 23,5 | 0,75<br>2<br>3    | <b>(1) Da non usare su terreni sabbiosi, trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione</b>   |
| <b>Post emergenza</b>  | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Imazamox  | 3,7                        | 0,75              |   |
|                        | Dicotiledoni                    | Bentazone   | 87                         | 0,75              | Coltura a 2 - 3 foglie vere   |
|                        | Graminacee                      | Fluazifop - p - butile                                      | 13,37                      | 1 - 1,2           |   |

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***